

DIE RHIZARTHROSE in Belgium

344.000

Belgen lijden
aan rhizartrrose⁽¹⁾

55-74

jaar
het meest getroffen⁽²⁾

2^e

meest voorkomende
artrose van de hand⁽²⁾



1 op 8 mannen
1 op 3 vrouwe
betroffen⁽³⁾

SYMPTOMEN

die moeten waarschuwen!


Steeds heviger pijn
aan de **basis van de
duim?**



Moeite om alledaagse
voorwerpen vast te
nemen?



Geleidelijke vervorming
van de duim?



*Ik heb pijn en ik kan mijn duim en
wijsvinger niet meer samen knijpen!*

WAT MOET IK DOEN?

Stapsgewijze aanpak van
de oplossingen

1

Radiologisch onderzoek

Bepaalt of u lijdt aan duimartrose
(rhizartrrose) of aan een andere
aandoening

2

Medische behandeling Verlicht de symptomen

Pijnstillers
Ontstekingsremmers
Nachtorthese
Injecties

3

Chirurgische behandeling Behandelt de slijtage van het gewricht op een duurzame manier

Verskillende ingrepen zijn mogelijk.
Onder andere het plaatsen van een
duimprothese (vergelijkbaar met een
miniheupprothese)

Als de medische behandeling
onvoldoende is en de symptomen
aanhouden, wordt een chirurgische
ingreep overwogen

Meer weten
over rhizartrrose



**SCAN
MIJ!**



www.mythumb.be